

Nombre: _____ Fecha de nacimiento: _____

Alergia a: _____

Peso: _____ lb

Asma: Sí (mayor riesgo de reacción grave) No

En caso de una reacción alérgica a alimentos o sospecha de ello:

COLOCAR LA
FOTO DEL
ALUMNO
AQUÍ

EPIPEN® (EPINEFRINA) INDICACIONES PARA EL AUTOINYECTOR

1. Retire el autoinyector EpiPen del estuche plástico. **2**
2. Retire la tapa de seguridad azul.
3. Coloque la punta naranja en dirección a la parte exterior media del muslo y presione firmemente.
4. Sostener durante, aproximadamente, 10 segundos. **4**
5. Retirar el dispositivo y masajear el área durante 10 segundos.

AUVI-Q™ (INYECCIÓN DE EPINEFRINA, USP) INDICACIONES

1. Retire el estuche de Auvi-Q. Esto activará automáticamente las instrucciones de voz. **2** **3**
2. Retire la tapa de seguridad roja.
3. Coloque el extremo negro contra la parte exterior media del muslo.
4. Presione con firmeza y sostenga durante 5 segundos.
5. Retirar el dispositivo del muslo.

ADRENALICK®/ADRENALICK® INDICACIONES GENERALES

1. Retire el estuche. **2** **3**
2. Retire las tapas grises marcadas como "1" y "2".
3. Coloque la punta redondeada roja contra la parte exterior media del muslo.
4. Presione con firmeza hasta que penetre la aguja.
5. Sostenga durante 10 segundos. Retirar el dispositivo del muslo.

OTRAS INDICACIONES/INFORMACIÓN (puede llevar la epinefrina consigo, puede autoadministrarse la epinefrina, etc.):